

ਰੋਪਾਟਾਇਟਿਸ C ਕੀ ਹੈ?

ਰੋਪਾਟਾਇਟਿਸ C ਜਿਗਰ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਣੂ ਵਾਲੀ ਲਾਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜਿਗਰ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਗਰ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਰੋਪਾਟਾਇਟਿਸ C ਵਿਸ਼ਾਣੂ (HCV) ਦੀ ਲਾਗ ਵਾਲੇ ਲਗਭਗ 75-85% ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾਣੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਿੰਦਗੀ ਲਈ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਸਦੇ ਲੱਛਣ ਕੀ ਹਨ?

ਇਸਦੇ ਲੱਛਣ ਵਿਸ਼ਾਣੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ 90% ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥਕਾਵਟ, ਭੁੱਖ ਨਾ ਲਗਣੀ, ਪੇਟ ਦਰਦ, ਜੀ-ਕੱਚਾ ਹੋਣਾ, ਉਲਟੀ, ਖਾਰਸ਼, ਪੀਲੀਆ (ਅੱਖਾਂ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਦਾ ਪੀਲਾ ਪੈਣਾ), ਅਤੇ ਜੇੜਾਂ ਅਤੇ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਦਰਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਾਣੂ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ; ਪਰ ਕੋਈ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਗਰ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਿਰੋਸਿਸ (ਦਾਗ) ਜਾਂ ਜਿਗਰ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

HCV ਕਿਵੇਂ ਫੈਲਦਾ ਹੈ?

- ਕਿਸੇ ਲਾਗ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਖੂਨ ਜਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਖੂਨ ਵਾਲੇ ਤਰਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਲਾਗ ਵਾਲੇ ਤਰਲ ਚਮੜੀ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾਣ।
- ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਪਕਰਣਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੂਈਆਂ, ਚਮਚ, ਸਟ੍ਰਾ ਅਤੇ ਫਿਲਟਰ, ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ।
- ਟੈਟੂ ਬਣਾਉਣ, ਸਰੀਰ ਛਿਦਵਾਉਣ, ਐਕਿਊਪੰਕਚਰ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰਤਾ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਲਈ ਕਿਟਾਣੂ-ਮੁਕਤ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਪਕਰਣ ਵਰਤਣ ਦੇ ਦੁਆਰਾ।
- ਖੂਨ ਬਦਲਵਾਉਣ ਜਾਂ ਖੂਨ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਉਤਪਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਪਾਟਾਇਟਿਸ C ਲਈ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 1992 ਤੋਂ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦਾਨਾਂ ਦੀ ਰੋਪਾਟਾਇਟਿਸ C ਲਈ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
- ਸੈਕਸ ਰਾਹੀਂ ਫੈਲਣਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜਣਨ ਅੰਗਾਂ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਫਲਾਹੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਮਾਸਿਕ ਧਰਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਖਤਰਾ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- HCV ਵਾਲੀਆਂ 1-5% ਔਰਤਾਂ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਜਨਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਮਾਂ ਨੂੰ HIV ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਖਿਆ 10-15% ਤਕ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
- ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਣ ਨਾਲ HCV ਮਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਨਿੱਪਲਾਂ ਤੋਂ ਖੂਨ ਵੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਾਰਾਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਠੀਕ ਹੋਣ ਤਕ ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਵੇ।

ਰੋਪਾਟਾਇਟਿਸ C ਪਾਈ, ਭੋਜਨ, ਚੁੰਮਣ, ਛਿੱਕਣ ਜਾਂ ਖਾਸੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਫੈਲਦਾ ਹੈ।

ਰੋਪਾਟਾਇਟਿਸ C ਦਾ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?

ਰੋਪਾਟਾਇਟਿਸ C ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਦੋ ਜਾਂਚਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਖੂਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜਾਂਚ ਰੋਪਾਟਾਇਟਿਸ C ਰੋਗਾਣੂਨਾਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਪਾਜ਼ਿਟਿਵ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੂਨ ਦੀ ਦੂਜੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੋਪਾਟਾਇਟਿਸ C ਰੀਬੋਨਿਊਕਲਿਅਕ ਐਸਿਡ (HCV RNA) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਵਿਸ਼ਾਣੂ ਅਜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਜੇ ਖੂਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜਾਂਚ ਪਾਜ਼ਿਟਿਵ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਖੂਨ ਦੀ ਦੂਜੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਹੈ?

ਰੋਪਾਟਾਇਟਿਸ C

ਹਾਂ, ਇਸਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੋਲ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

- ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉ ਕਿ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਟੈਟੂ, ਸਰੀਰ/ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਰੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ, ਐਕਿਊਪੰਕਚਰ, ਜਾਂ ਸੁੰਦਰਤਾ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਲਈ ਰੋਗਾਣੂ-ਮੁਕਤ/ਨਵਾਂ ਉਪਕਰਣ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
- ਸੈਕਸ ਸਬੰਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਥੇ ਖੂਨ ਮੌਜੂਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੰਡੋਮ ਜਾਂ ਡੈਂਟਲ ਡੈਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।
- ਅਜਿਹੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਨਾ ਕਰੋ ਜੋ ਖੂਨ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ (ਰੋਜ਼ਰ, ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਬੁਰਸ, ਨੇਲ ਕਲਿੱਪਰ, ਨੇਲ ਫਾਈਲਾਂ)।
- ਆਪਣੀ ਚਮੜੀ ਤੇ ਕੱਟ ਅਤੇ ਛਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਟੀ ਨਾਲ ਢੱਕੋ।
- ਖੂਨ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ (ਟੈਂਪੂਨ, ਡੈਂਟਲ ਫਲੋਸ, ਪੱਟੀਆਂ) ਨੂੰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਬੈਗ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਸੁੱਟੋ।
- ਜੇ ਮੁਢਲੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਰੁਟੀਨ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ (ਦਸਤਾਨੇ ਪਹਿਨੋ, ਖੂਨ ਦੇ ਦਾਗ ਵਾਲੀਆਂ ਸਤ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਰੋਗਾਣੂ-ਮੁਕਤ ਕਰੋ, ਖੂਨ ਦੇ ਦਾਗ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਬੈਗ ਵਿੱਚ ਪਾਉ, ਦਸਤਾਨੇ ਉਤਾਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਧੋਵੋ)।

ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰੋਪਾਟਾਇਟਿਸ C ਦੀ ਲਾਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰੋਪਾਟਾਇਟਿਸ C ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਟੀਕਾ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਪਾਟਾਇਟਿਸ C ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਲੇ ਰੋਪਾਟਾਇਟਿਸ A ਅਤੇ ਰੋਪਾਟਾਇਟਿਸ B ਦੇ ਟੀਕੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਪਤੇ ਤੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ:

905-799-7700 ਤੇ ਪੀਲ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ।
www.peelregion.ca

ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲਿਵਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ
(416) 491-3353 ਜਾਂ 1-(800) 563-5483
www.liver.ca

CATIE ਰੋਪਾਟਾਇਟਿਸ C
1-800-263-1638
www.hepcinfo.ca